Аргентинская геморрагическая лихорадка (Хунин)



ФКУЗ Ростовский – на – Дону противочумный институт Роспотребнадзора
Лаборатория санитарной охраны территории
Составитель: Рыжова А.А.



Аргентинская геморрагическая лихорадка (Хунин)

Аргентинская геморрагическая лихорадка тяжелое инфекционное вирусное заболевание.

Лихорадка Хунин регистрируется в жарких странах. Резервуаром и источником инфекции являются грызуны. Вирус удалось выделить также от *клещей*.



Для заболевания характерна **сезонность** - с февраля по июнь,
Наибольшее число заболевших наблюдается в мае. Болеют преимущественно сельские жители. Заражение Происходит воздушно-пылевым путём, при вдыхании пыли загрязненной выделениями от грызунов, а также через продукты питания, инфицированные мочой грызунов.
С момента заражения до появления первых признаков болезни проходит от 6-8 до 12-16 дней.

Симптомы лихорадки Хунин

Как правило, развитие заболевания происходит постепенно. В начальном периоде продолжительностью 3-4 дня у больного наблюдаются следующие признаки:



- недомогание
- головная боль
- раздражительность
- озноб
- мышечные боли, особенно в поясничной области
- на слизистых оболочках полости рта кровоизлияния, эрозии

В настоящее время вакцинация, защищающая от данного заболевания не разработана.

Основной метод борьбы, профилактика заболевания

Предотвращение заболевания достигается не специфическими методами. В основе профилактических мероприятий лежит дератизация, дезинсекция, соблюдение гигиенических требований к пище и вдыхаемому воздуху.







ARGENTINE HEMORRHAGIC FEVER (JUNIN)



ФКУЗ Ростовский – на – Дону противочумный институт Роспотребнадзора
Лаборатория санитарной охраны территории
Составитель: Рыжова А.А.



Argentine hemorrhagic fever (Junin)

Argentine hemorrhagic fever is a severe infectious viral disease.

Junin fever is registered in tropical countries. Reservoir and source of infection are 1rodents. The virus was isolated also from *ticks*.

The disease is characterized by **seasonality** - from February to June, the largest number of cases occurs in May, most in rural regions. Infection occurs due to inhalation of dust contaminated with rodent excrements, as well as through food contaminated with urine of rodents.



The period from the moment of infection until the first signs of the disease is from 6-8 to 12-16 days.

Symptoms of Junin fever

As a rule, the disease occurs gradually. In the initial period of 3-4 days in patient are observed the following symptoms:



- malaise
- headache
- irritability
- chills
- muscle pain, especially in the lumbar region
- hemorrhage, erosion on the mucous membranes of the oral cavity

Curerently, there is on protective vaccine against this disease i

The main method of struggle, the prevention of disease.

Prevention is achieved with nonspecific methods. The base preventive measures are: rodent control, pest control, observation to hygienic norm of food and inhaled air.





